

آسیب اقلیت‌های جنوب آسیا در موج دوم کرونا

تایچ یک بررسی چاپ شده در نشریه لانست نشان میدهد: گروه‌های قومی جنوب آسیا در انگلیس طی موج دوم شیوع کروناویروس بیش از سایر گروه‌های اقلیت قومی در معرض خطر عفونت، ابتلا به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ و مرگ ناشی از آن قرار داشتند.

به گزارش سایت خبری پرسون، موج نخست شیوع کروناویروس که از فوریه ۲۰۲۰ آغاز شد و تا ماه سپتامبر ادامه داشت، تست مثبت کرونا، موارد بستری در بیمارستان و مرگ ناشی از این ویروس در بین همه گروه‌های اقلیت‌های قومی در انگلیس بالا بوده است.

هرچند در موج دوم بیماری که از ماه سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۰ بوده، وضعیت اقلیت‌های قومی به استثنای اقلیت‌های قومی جنوب آسیا بهتر بوده است.

به گفته محققان انگلیسی، به رغم بهبودهای بدست آمده در بیشتر اقلیت‌های قومی در موج دوم بیماری در مقایسه با موج نخست، تفاوت گسترده میان اقلیت‌های آسیایی نگران کننده است.

محققان اظهار داشتند: خطر بیشتر مثبت بودن آزمایش کروناویروس با تعداد بیشتر افراد در خانواده‌های جنوب آسیا مرتبط است. سرشماری سال ۲۰۱۱ نشان داد که ۲۱ درصد از اقلیت‌های قومی جنوب آسیا در خانواده‌های چند نسلی زندگی می‌کنند در حالیکه این رقم در گروه‌های سفید پوست هفت درصد است. هرچند فاکتورهای دیگر از قبیل وزن، فشار خون و بیماری‌های نهفته نیز موثر هستند.