

احتمال بروز واکنش‌های اضطرابی با تزریق این واکسن

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا اعلام کرد: واکسن کرونای شرکت داروسازی «جانسون اند جانسون» ممکن است باعث بروز واکنش‌های اضطرابی مانند غش کردن شود.

به گزارش سایت خبری پرسون، این مرکز در گزارشی تاکید کرد که بیش از ۶۰ نفر که در اوایل این ماه واکسن تک دوز «جانسون اند جانسون» را در پنج مرکز توزیع دریافت کردند، واکنش‌های مربوط به اضطراب مانند غش و سرگیجه را تجربه کرده‌اند.

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا یادآور شد: این واکنش‌ها که می‌تواند با تمام واکسن‌ها اتفاق بیفتد، قبل از علنی شدن گزارش‌ها در مورد بروز لخته خونی در تعدادی زن که این واکسن را تزریق کرده بود به این سازمان گزارش شد.

این مرکز در گزارش خود خاطرنشان کرد: حوادث مربوط به اضطراب از جمله غش کردن، می‌تواند بلافاصله پس از واکسیناسیون با هر واکسنی رخ دهد و ممکن است به دلیل اضطراب از دریافت تزریق باشد.

براساس گزارش محققان این مرکز، اگرچه چهار سایت از پنج سایت واکسیناسیون دسته جمعی که وقایع مربوط به اضطراب را گزارش کرده بودند، واکسیناسیون کووید-۱۹ را به طور موقت به حالت تعلیق درآوردند اما هیچ یک از آنها جدی نبودند.

سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده اضطراری برای واکسن تک دوز کووید-۱۹ شرکت داروسازی جانسون اند جانسون را در اواخر فوریه صادر کرد.

در تاریخ ۱۳ آوریل پس از آنکه ۶ زن به دنبال دریافت واکسن کرونای جانسون اند جانسون دچار لخته خونی شدند، سازمان غذا و دارو و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا به ایالت‌های این کشور دستور دادند که تزریق این واکسن را متوقف کنند.

مقامات گفتند در آن زمان بیش از ۶ میلیون نفر تحت تزریق این واکسن قرار گرفته بودند. در مجموع، در پایگاه‌هایی که واکسن کرونای جانسون اند جانسون تزریق می‌شد، تقریباً ۹۰۰۰ دوز واکسن طی سه روز تجویز شد و واکنش‌های مربوط به اضطراب در ۶۴ گیرنده رخ داد.

شایع‌ترین واکنش‌های مربوط به اضطراب سرگیجه بود که در ۱۹ نفر از افرادی که این واکسن را دریافت کرده بودند، بروز کرد و غش یا ایست قلبی نیز در ۱۷ نفر رخ داد.

۱۰ گیرنده دیگر این واکسن بلافاصله پس از دریافت این مایه کوبی حالت تهوع و استفراغ را تجربه کردند.

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا اعلام کرد: در فاصله زمانی میان اول مارس و ۱۲ آوریل، ۶۵۳ نفر از تقریباً ۸ میلیون نفری که واکسن جانسون و جانسون را در این کشور دریافت کرده بودند، بلافاصله پس از تزریق این واکسن غش کردند. تقریباً نیمی از آنها بزرگسالان جوان ۱۸ تا ۲۹ ساله بودند.

محققان این سازمان اظهار داشتند: حوادث مربوط به اضطراب، از جمله غش کردن، می‌تواند بلافاصله پس از واکسیناسیون کووید-۱۹ رخ دهد؛ این موضوع می‌تواند نگرانی سایر گیرندگان واکسن و اعضای کارکنان را به ویژه در پایگاه‌هایی که واکسیناسیون دسته جمعی در آن صورت می‌گیرد، گسترش دهد.

آنها گفتند: تمام دریافت کنندگان واکسن کووید-۱۹ باید دست کم ۱۵ دقیقه برای بروز بیماری‌های مرتبط با اضطراب و سایر موارد تحت نظر قرار گیرند.

ویروس کرونا موسوم به «کووید ۱۹» اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۴ آذر ۱۳۹۸) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد.

ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده شد؛ اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

«تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه همه‌گیر (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد؛ اما ارزیابی‌های این سازمان ویروس کرونا را «همه‌گیر جهانی» شناسایی و اعلام می‌کند.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران درگیر پاندمی ویروس کووید ۱۹ هستند.