

فوق تخصص خون و سرطان اطفال در کرمانشاه گفت:

باقالا در دوران کرونا با احتیاط مصرف شود

ابتلا به کرونا در افراد مبتلا به فاویسم با مصرف باقالا ممکن است باعث شروع حمله همولیز شود.

به گزارش سایت خبری پرسون، فوق تخصص خون و سرطان اطفال در کرمانشاه گفت: ابتلا به کرونا در افراد مبتلا به فاویسم با مصرف باقالا ممکن است باعث شروع حمله همولیز شود.

محمدرضا گلپایگانی امروز در گفت‌وگویی، درخصوص فاویسم بیماری باقالا، اظهار داشت: فاویسم نوعی کم خونی ارثی است که به دلیل کمبود آنزیمی به نام G6PD بروز پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مصرف باقالا در این افراد به علت داشتن مواد اکسیدان موجب از بین رفتن پیش از موعد گلبول‌های قرمز شده و فرد مبتلا به کم‌خونی می‌شود.

این فوق تخصص خون و سرطان اطفال در کرمانشاه تصریح کرد: این بیماری در جنس مذکر بیشتر اتفاق می‌افتد اما در دختران هم قابل مشاهده است.

وی افزود: فاویسم مختص به فصل خاصی نیست، اما شیوع آن در فصل بهار و با آمدن باقالا به بازار بیشتر است.

گلپایگانی تصریح کرد: معمولاً دو یا سه روز بعد از مصرف باقالا حمله همولیز شروع می‌شود، سه تا پنج روز بعد از مصرف باقالا بیماری به شدت خود می‌رسد، در صورت مراجعه دیر هنگام به پزشک و در موارد شدید، این بیماری ممکن است منجر به مرگ شود.

وی رنگ پریدگی، تغییر رنگ ادرار به رنگ چای پررنگ و زردی (زرد شدن سفیدی چشم) را به عنوان سه علامت این بیماری بیان کرد و گفت: در افرادی که کمبود آنزیم G6PD وجود دارد علاوه بر باقالا، مصرف برخی داروها همچون کوتریموکسازول، نیتروفرانتوئین، فورازولیدون، نالیدیکسیک اسید، منجر به شروع همولیز و علائمی شبیه فاویسم می‌شوند.

گلپایگانی اضافه کرد: مصرف داروهایی همچون استامینوفن، دیفن هیدرامین و آسپرین اگر با دزهای معمولی استفاده شود باعث همولیز نشده و مصرف آن‌ها بلامانع است.

وی از بیماران مبتلا به فاویسم خواست، از خرید شیرینی‌های که به جای مغزها با باقالای خشک تزئین شده‌اند خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: افراد مبتلا به فاویسم ممکن است با استشمام بوی باقالا حساسیت نشان دهند و علائم این بیماری در آن‌ها بروز پیدا کند و ابتلا به کرونا در افراد با کمبود آنزیم G6PD ممکن است باعث شروع حمله همولیز شود.

وی تصریح کرد: شدت حملات همولیز بسته به مقدار مصرف باقالا، نوع خشک یا تازه و جنس باقالا به علت میزان ماده اکسیدان وارد شده در بدن متفاوت است مثلاً مصرف نوع تازه نسبت به مصرف باقالا خشک شده علائم بیشتری ایجاد می‌کند.

این فوق تخصص خون و سرطان اطفال، بهترین راه درمان فاویسم را، پیشگیری و پرهیز از مصرف باقالا و داروهای ممنوعه عنوان کرد.

منبع: فارس