

کدام سویه کرونا موجب کووید طولانی‌مدت می‌شود؟

نتایج تحقیقی نشان داده است که بیماران مبتلا به سویه دلتای ویروس کرونا در معرض خطر بیشتری برای مواجهه با علائم طولانی مدت هستند.

به گزارش سایت خبری پرسون، اداره آمار ملی بریتانیا گفت که احتمال گزارش خستگی، تنگی نفس، مشکل در تمرکز و سایر علائم پایدار به دنبال عفونت‌هایی که احتمالا توسط سویه امیکرون BA.۱ ایجاد می‌شود ۵۰ درصد کمتر از مواردی است که احتمالا توسط سویه دلتا ایجاد می‌شود.

تفاوت در شکاف علائم در میان بزرگسالانی که در هنگام ابتلا دو بار واکسینه شده بودند مشهودتر بود اما در میان افرادی که سه بار واکسینه شده بودند، این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود.

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد در میان بزرگسالان واکسینه شده با سه دوز واکسن، احتمال گزارش کووید طولانی‌مدت به دنبال عفونت با سویه امیکرون BA.۲ بیشتر از BA.۱ بود.

بر اساس آمار این اداره، بیش از دو سوم از مبتلایان، کووید طولانی‌مدت گزارش کردند (۱.۲ میلیون نفر) که این علائم فعالیت‌های روزمره آنان را تحت تاثیر قرار داده است و تقریبا یک پنجم گفتند که این علائم آنها را بسیار محدود می‌کند.

علائم کووید طولانی معمولا تهدیدکننده زندگی نیستند اما به دلیل تنگی نفس یا خستگی باعث ناراحتی بیمار می‌شوند.

دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده در گزارشی در ماه مارس اعلام کرد که کووید طولانی‌مدت می‌تواند از طریق کاهش مشارکت نیروی کار و افزایش نیاز به استفاده از بیمه از کار افتادگی تامین اجتماعی یا سایر بیمه‌های یارانه‌ای عمومی بر اقتصاد کلان تاثیر بگذارد.