

شناسایی یک فاکتور پرخطر احتمالی سرطان سینه

یک مطالعه جدید از یک عامل خطر احتمالی برای سرطان سینه پرده برداشته است که می تواند به پزشکان با دقت بیشتری برای تشخیص این بیماری کمک کند.

به گزارش سایت خبری پرسون، در حالی که مشخص است زنان دارای بافت سینه متراکم با خطر بیشتر ابتلاء به سرطان سینه روبرو هستند و تراکم پستان با افزایش سن کاهش می یابد، حال محققان شواهدی از خطر ابتلاء به سرطان سینه با کاهش تراکم پستان به طور ناموزون پیدا کرده اند.

از جمله این یافته ها این بود که وقتی یک پستان کاهش آهسته تری در تراکم داشته باشد، احتمال سرطان در آن سینه به مراتب بیشتر است.

«شو جیانگ»، نویسنده مطالعه از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، گفت: «من امیدوارم که بتوان این کار را در اسرع وقت به استفاده بالینی رساند. می توان دستورالعمل های مختلف برای ریسک را برای نظارت بر کسانی که کاهش بسیار کُندتری در تراکم بافت دارند، تنظیم کرد.»

این مطالعه شامل حدود ۱۰ هزار زن در طول ۱۰ سال پیگیری بود. زنان در شروع مطالعه سرطان نداشتند، اما ۲۸۹ زن تا پایان مطالعه به سرطان مبتلا شدند. محققان آنها را با ۶۵۸ زن مشابه که دچار سرطان سینه نشده بودند مقایسه کردند.

زنانی که در طول مطالعه به سرطان مبتلا شدند، در شروع مطالعه، تراکم پستان بالاتری داشتند.

این کشف می تواند یک ابزار جدید برای تشخیص باشد و این امکان را فراهم می کند تا پس از شروع ماموگرافی، تراکم پستان را در زمان های مختلف ارزیابی کند.

جیانگ خاطرنشان کرد: «خطر ابتلاء به سرطان پستان می تواند هر بار که ماموگرافی جدید انجام می شود، به روز شود.»

منبع: بهداشت نیوز